Dysplasie du ventricule droit

Martine Gilard
CHU Brest

DVDA

- Anomalie myocardique du ventricule D
- Caractéristiques cliniques
 - Arythmies
 - ESV d'origine ventriculaire droite
 - Mort subite

Basso et al Circulation 1996; 94:983-991

Corrado et al Circulation 2000;101:E101-E106

Metzger et al AmJCardiol 1993;72:964-967

Pinarmoni et al Heart 2000;4:356-364

Van der Wall et al Herz 2000;4:356-364

DVDA

- **Prévalence**

- Incidence: **1/2500 à 1/5000** selon les études
- Touche plus les hommes (ratio 3:1)
- Cause majeure de mort subite de l'adulte jeune
 - 20% des adultes < 35 ans
 - 22% des jeunes athlètes

Thiene et al NEJM 1988;318:129-133

- **Diagnostic**

- angiographie
- échocardiographie
- scintigraphie
- Scanner multicoupes
- IRM

DVDA

Etiologie

- Cardiomyopathie
- Atteinte progressive du muscle cardiaque
- Prédomine chez l'homme

DVDA

Etiologie

4 théories

- Destruction programmée des cellules, remplacées par du tissu graisseux responsable d'arythmies
- Cardiopathie congénitale avec développement anormal conduisant à la dysplasie
- Trouble métabolique du VD responsable d'un remplacement progressif des cellules par du tissu graisseux et fibreux
- Théorie « inflammatoire »: le tissu fibro-graisseux correspond à la cicatrisation d'une atteinte de type myocardite

Basso et al Circulation 1996; 94:983-991

James et al Circulation 1994;90:556-573

Hofman et al Eur Heart J 1993;14:717-720

DVDA

Etiologie

- **Atteinte familiale**
 - 30-50%
 - Principalement autosomique dominant
 - pénétrance variable
 - Expression phénotypique variable
 - Anomalie des chromosomes 14 et 3
 - 4 zones ont été identifiées

*Corrado et al Circulation
2000;101:E101-E106*

*Ahmad et al Circulation
1998;98:2791-720*

Nava et al JACC 1988;12:1222-1228

*Rampazzo et al Hum Mol Genet
1995;4:2151-2154*

DVDA

Gènes impliqués

Desmocollin 2 - DSC2

Desmoglein 2 - DSG2

Desmoplakin - DSP

Junction plakoglobin - JUP

LIM domain binding 3 - LDB3

Plakophilin 2 - PKP2

Ryanodine receptor 2 (cardiac) - RYR2

Transforming growth factor, beta 3 - TGFB3

Transmembrane protein 43 - TMEM43

DVDA

Anatomo-pathologie

- 2 formes différentes
 - **Forme grasseuse:**
 - Remplacement quasi complet du myocarde
 - Pas d' amincissement de la paroi
 - Atteinte exclusive du VD
 - **Forme fibro-grasseuse:**
 - Remplacement quasi complet du myocarde
 - Amincissement de la paroi
 - Atteinte du VD et du VG

Thiene et al NEJM 1988;318:129-133
Corrado et al Heart 2000;83:588-595

DVDA

Anatomo-pathologie

- **Anomalies associées:**
 - Dilatation globale et importante du VD
 - Anévrisme ventriculaire
 - Hypocinésie segmentaire
 - Le siège de ces anomalies: triangle de la dysplasie
 - Sous la tricuspide
 - Apex
 - infundibulum

DVDA

Anatomo-pathologie

DVDA

Clinique

- Très grandes variations cliniques
 - TV avec BBGC
 - Asymptomatique: qcq ESV
 - Jusqu' à IC avec arythmie et mort subite
 - Progression de la maladie avec des manifestations différentes en fonction de l' évolution

Van der Wall et al Herz 2000;4:356-364

Pinarmoni et al Circulation 1998;97:1943-1945

- ECG

- Rythme sinusal
- QRS >110 ms en V1
- Epsilon juste après QRS en V1

McKenna et al Br Heart J 1994;71:215-218

DVDA

DVDA

TV et BBGC

DVDA

Diagnostic

- Diagnostic est affirmé par la biopsie
- Cependant
 - Infiltration graisseuse existe dans 50% des cœurs normaux des sujets âgés
 - Infiltration graisseuse au niveau de l'apex du VD dans 15% des cas

Burke et al Circulation 1998;97:1571-1580

Fontaliran et al Arch Mal Cœur Vaiss 1991;84:33-38

White et al Radiology 1998;207:743-751

Blake et al AJR 1994;162:809-812

Donc, pas d'indication à la biopsie du VD

DVDA

Diagnostic

- Consensus de l' ESC: diagnostic repose sur la présence de facteurs
 - Structuraux
 - Histologiques
 - Electrocardiographiques
 - Arythmiques
 - Facteurs génétiques

DVDA

2 critères majeurs, 1 majeurs et 2 mineurs, 4 mineurs

• Facteurs

Dysfonction

Altérations structures

Tissue

Anomalies électriques

Arythmie

ATCD familiaux

• C Majeurs

Dilatation majeure VD

Altération FE VD

Anévrysmes VD

Myocytes >60% +fibrose

Onde Epsilon

T- V1 à V4 sans BBDC

TV ou BBGC

QRS – en inf

Maladie familiale confirmée

• C Mineurs

Dilatation mineure

Altération modérée FE

Hypocinésie régionale

Myo 60-75% +fibrose

T négative V2-V3

Potentiels tardifs

TV+BBGC,

QRS + en inf

ATCD mort subite suspecte

DVDA

Diagnostic

- **Diagnostic différentiel**
 - Maladie de Uhl
 - Amincissement extrême de la paroi du VD
 - Absence de fibres musculaires
 - Pas de dominance de sexe et d'influence familiale
 - Cardiomyopathie idiopathique
 - Souvent survient après l'atteinte du VG
 - Myocardite

DVDA

Pronostic et traitement

- Maladie progressive
- Mortalité par mort subite: 2,5% par an
- Amélioré par le traitement
 - Anti arythmiques
 - Ablation pour les formes réfractaires et localisées
 - Améliore l'efficacité du TTT pharmacologique
 - Défibrillateur: arythmie sévère et risque de mort subite
 - Chirurgie: déconnection du VD ou transplantation (IVD)

Fontaine et al A Rev Med 1999;50:17-35

Marcus et al Circulation 1982;65:384-398

Leclercq et al Eur Heart J 1989;10:61-67

Movsowitz et al Am Heart J 1996;131:930-936

DVDA

Pronostic et traitement

Âge de mort subite chez 45 patients atteints d' ARVC

DVDA

Diagnostic

- **Angiographie conventionnelle**
 - Gold standard
 - Sensibilité et spécificité modérée
 - Pas de détection des anomalies tissulaires

White et al, Radiology 1998;207:743-751

Marcus et al Circulation 1982;65:384-8

Mehta et al Am J Cardiol 1989;3:939-944

DVDA

Diagnostic

- **Angiographie conventionnelle**
 - Gold standard
 - Aspect en pile d'assiette avec akinésie ou dyskésie
 - Infundibulum
 - Apical
 - Région tricuspideenne

DVDA

Diagnostic

- **Echocardiographie**
 - Surtout pour éliminer d' autres diagnostics

Ces techniques classiques sont cependant

- faiblement spécifiques
- faiblement sensibles

White et al Radiology 1998;207:743-751

Marcus et al Circulation 1982;65:384-398

Mehta et al Am J Cardiol 1989;3:939-944

DVDA

Diagnostic

IRM

DVDA

Diagnostic IRM

- **IRM permet**
 - Analyse tridimensionnelle du VD
 - Anatomie
 - Volume
 - Anomalie tissulaire
 - Fibro grasseuse
 - grasseuse

DVDA

Diagnostic
IRM

Anomalies tissulaires

DVDA

Diagnostic IRM

- Anomalies tissulaires
 - Graisse: hyper signal en T1

Basso et al Circulation 1996;94:983-991

Thiene et al NEMJ 1988;318:129-133

Menghetti et al Heart 1996;76:467-470

Marcus et al Eur Heart J 1989;10:61-67

Globits et al Circulation 1997;96:2633-40

DVDA

Diagnostic IRM

- Anomalies tissulaires
 - Graisse: hyper signal en T1

Séquence T1

Séquence avec saturation de graisse

DVDA

Diagnostic

• Anomalies tissulaires IRM

- Graisse: hyper signal en T1
- Rechercher également par
 - une séquence de rehaussement tardif,
 - associée à une acquisition en saturation de graisse,
 - sans antenne de surface

DVDA

Diagnostic IRM

- Anomalies tissulaires

Possible atteinte VG associée

DVDA

Diagnostic IRM

- Présence d'inclusions graisseuses: spécifique ?

- 50% des cœurs normaux

Mehta et al Circulation 1998;97:1571-1580

Fontaliran et al Arch Mal CV 1991;84:33-38

- 22% des patients suspects de DVDA (TV+BBGC)

Mehta et al Am Heart J 1994;127:360-366

- Sensibilité: 67% et spécificité 100%

Mehta et al Am Heart J 1994;127:360-366

22% Aufferman et al AJR 1993;161:549-555

100% Basso et al Circulation 1996;94:983-991

DVDA

Diagnostic
IRM

Anévrysmes

DVDA

Diagnostic IRM

- Anévrismes localisés de la paroi du VD

Infundibulum

DVDA

Diagnostic
IRM

Dilatation de la cavité VD

DVDA

Diagnostic

- Dilatation VD

IRM

Cavité VD

Infundibulum VD

Systole

Diastole

DVDA

Diagnostic
IRM

Trouble de la cinétique

DVDA

Diagnostic IRM

- Dyskinésie localisée du VD

Diastole

Systole

Rehaussement
tardif

DVDA

Diagnostic IRM

- Critères majeurs

- Akinésie régionale ou dyskinésie ou asynchronisme contraction VD et 1 des éléments suivants:
 - Ratio volume VD en fin de diastole sur surf corp:
 $\geq 110 \text{ mL/m}^2$ (homme) ou $\geq 100 \text{ mL/m}^2$ (femme)
 - Ou FE VD $\leq 40\%$

DVDA

Diagnostic IRM

- Critères mineurs

- Akinésie régionale ou dyskinésie ou asynchronisme contraction VD et 1 des éléments suivants:

- Ratio volume VD en fin de diastole sur surf corp:

- Entre 100 et 110 mL/m² (homme)

- Entre 90 et 100 mL/m² (femme)

- Ou FE VD entre 41% et 45%

DVDA

Diagnostic

Scanner multicoupes

DVDA

Diagnostic Scanner multicoupes

- **Avantages**

- Bonne résolution spatiale > IRM
- Examen en coupe, visualisant la paroi myocardique
- Etude de la fonction du VD
- Analyse de trouble localisée de la cinétique
- Pas de CI si PM

- **Inconvénients**

- Irradiation
- Produit iodé
- Rythme sans ESV

DVDA

Diagnostic Scanner multicoupes

- Tissu gras
– Densité: - 20 à -70 UH

DVDA

Diagnostic Scanner multicoupes

- Tissu gras
– Densité: - 20 à -70 UH

DVDA

Diagnostic Scanner multicoupes

- Tissu gras

Infundibulum

Septum

Paroi inf et apical

DVDA

Diagnostic Scanner multicoupes

- Tissu graisseux

DVDA

Diagnostic Scanner multicoupes

- Dilatation VD

Infiltration graisseuse

DVDA

Diagnostic Scanner multicoupes

- Aspect en pile d'assiettes

VD dilaté
Infiltration graisseuse
Trabéculations

DVDA

Diagnostic Scanner multicoupes

- IRM et Scanner multicoupes

Scanner

IRM

IRM et
saturation graisse

DVDA

Myocardite et DVDA

- 30 patients suspects de DVDA
- TV + BBGC

DVDA

Myocardite et DVDA

– Pas de différence structurelle et fonctionnelle

- ECG
- Angiographie
- Echocardiographie
- IRM
 - Hypersignal 67% DVDA
62% myocardite

DVDA

Myocardite et DVDA

- Histologie fait la différence
 - (p<0,001)
 - DVDA: 30% (9 pts)
 - Myocardite: 70% (21 pts)

- FU

- Myocardite: stable sous TTT
- DVDA: Défibrillateur chez 5 patients sur 9

DVDA

Conclusion

- Le diagnostic repose sur un ensemble de critères
- Un seul critère est insuffisant
- Pas d'imagerie véritablement spécifique
- L'IRM, non invasive, permet de suspecter le diagnostic et de réaliser le FU
- IRM normale: il faut la répéter à distance